

## วิธีทำให้ผู้ป่วยอาเจียนเนื่องจากได้รับสารพิษ

โดยให้ผู้ป่วยกินน้ำเชื่อม Ipecac 30 ml ตามด้วยน้ำอีก 3-4 แก้ว

เด็ก 6 เดือน – 1 ปี ให้ขนาด 10 ml

เด็ก 1-5 ปี ให้ขนาด 15 ml

ถ้าให้ยาแล้วเกิน 1/2 ชม. ยังไม่อาเจียน ทานซ้ำได้อีกครั้ง

## วิธีเตรียม Ipecac syrup จาก Ipecac tinc.

ปริมาตร Ipecac tinc. ที่ใช้ = ปริมาตร Ipecac syrup ที่แพทย์สั่ง  $\times \frac{3}{4}$

## ตัวอย่างการคำนวณ

แพทย์สั่ง Ipecac syrup 10 ml ให้เอา Ipecac tinc.  $\frac{3}{4}$  ส่วน = 7.5 ml

แล้วผสมด้วย syrup 2.5 ml ได้ปริมาตรรวม 10 ml

แต่รสชาติทานยาก อาจจ่ายน้ำเชื่อมต่างหากอีก 5 ml เพื่อผสมให้ทานง่ายขึ้น

มีความเข้มข้น emetine (สารสำคัญ) = 150 mg/ 100 ml

**\*\*ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่แพ้แอลกอฮอล์\*\***

## หมายเหตุ

1. Ipecac tinc. มีความเข้มข้น emetine (สารสำคัญ) = 200 mg/ 100 ml

2. ประยุกต์การเตรียมแบบง่ายๆ โดยยึดสารสำคัญเป็นหลัก แต่ถ้าแพทย์ต้องการความเข้มข้นมากขึ้น

สามารถทำได้โดยคำนวณความเข้มข้นที่แพทย์ต้องการ แล้วแยกจ่ายน้ำเชื่อมต่างหาก เพื่อผสมให้ดื่มพร้อมกบ  
ยา

ข้อมูลจาก วารสารคลินิก (ไม่ทราบปี)