

วิธีผสมยาน้ำยา (ยาปฏิชีวนะชนิดผง)

1. เขย่าขวดให้ผงยากระจายออกจากกันก่อน
2. เติมน้ำดื่มสุกที่เย็นแล้ว หรือน้ำสะอาดผสมยาตามปริมาณที่กำหนด (ห้ามใช้น้ำร้อน!!/น้ำอุ่น!!เด็ดขาด) ถ้าผงยาละลายแล้วได้ ปริมาณน้อยกว่าขีดที่กำหนด ให้เติมน้ำเพื่อปรับปริมาตรอีกครั้ง (ยกเว้นยาที่อยู่ในข้อ B)
3. เขย่าขวดให้ผงยาละลายเข้ากัน
4. เก็บในตู้เย็น หลังจากผสมเสร็จแล้ว

(ยกเว้น Zinnat suspension เพราะยาจะขึ้นเหน็ด เท ออกลำบาก / Zithromax, Klacid, Cefspan จะทำให้ยารสชาติขม)

****กลุ่ม augmentin แพทย์นิยมให้ใช้น้ำเย็นผสมยา****

A ยาปฏิชีวนะชนิดผงที่ผสมน้ำตามขีด หรือ ส่วนนูนของขวดยา

1. Amoxycillin dry syrup (125, 250 mg/5 ml)
2. Amoksiklav dry syrup (457 mg/5 ml) ****ต้องเก็บในตู้เย็นทันที หลังจากผสมยาเสร็จ****
และ Ranclav dry syrup (228.5 mg/5ml)
3. Augmentin dry syrup (156, 228, 457mg/ 5 ml, Augmentin ES)
****ต้องเก็บในตู้เย็นทันที หลังจากผสมยาเสร็จ****

(เติมน้ำเย็นถึงขีดประมาณ **ครึ่งหนึ่ง** ของระดับน้ำตามที่ระบุไว้ที่ข้างขวดเท่านั้น แล้วเขย่า ก่อนเติมอีกครั้งเพื่อให้ถึงระดับที่กำหนด)

4. Colistin (1,000,000 unit/ขวด) -เติมน้ำให้ได้ปริมาตรยา 10 ml จะมีความเข้มข้น 100,000 unit/ml (ถ้าถึงขีด ปริมาตรจะได้ไม่ถึง 10 ml=6.67 ml และจะได้ความเข้มข้น 150,000 unit/ml)
ปัจจุบัน ให้ผสมเฉพาะความเข้มข้น 100,000 unit/ml เท่านั้น
5. Distaclor dry syrup (125, 250 mg/ 5 ml) -มีขีดนูน 60 cc
6. Erythromycin dry syrup (125 mg/ 5 ml) -มีขีดนูนที่ข้างขวด
7. Ibilex dry syrup (125 mg/ 5ml)
8. Keflex dry syrup (125 mg/5ml) -มีขีดนูน 60 cc
9. Klacid dry syrup (125 mg/5ml)
10. Miotin dry syrup(30 ml, 60 ml.) -มีขีดลูกศรสีดำ
(เขย่าแล้วจะมีฟองมาก...ห้ามเขย่าแรง.. ต้องรอให้ฟองยุบหมดก่อน จึงดูปริมาตรน้ำอีกครั้ง)
11. Orbenin (ปัจจุบันใช้ Cloxacillin) dry syrup (125mg/ 5 ml)
12. Procef dry syrup (250 mg/5 ml)
13. Unasyn dry syrup POS (250mg/ml) - มีเส้นสีแดงรอบขวด
14. Vercef dry syrup (125, 250 mg/ 5 ml)
15. Zmax 2 gm ใช้น้ำ 60 ml หรือน้อยกว่า ค่ะให้หมดในครั้งเดียว

B. ยาปฏิชีวนะชนิดผงที่ผสมน้ำตามปริมาณที่บริษัทให้มาเท่านั้น

1. Cedax (180 mg/5 ml) ใช้ถ้วยตวงน้ำถึงขีด 25 ml เติมน้ำลงไปในขวดยา (ระวังอย่าใช้น้ำถึงขีด 50 ml)

2. Cefspan (100 mg/5 ml) ใช้ถ้วยตวงน้ำ 20 ml เติมน้ำลงในขวดยา

****ผงยาจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันช้า ต้องเขย่าและตั้งไว้อย่างน้อย 30 นาที****

3. Omnicef (125 mg/5 ml) ตวงน้ำ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใช้ถ้วยตวงน้ำถึงขีด 10 ml ตามที่กำหนด เติมน้ำลงไปในขวดยา ครั้งที่ 2 ใช้ถ้วยตวงน้ำ ถึงขีด 9 ml ตามที่กำหนด เติมน้ำลงไปในขวดยา รวมปริมาตรทั้งหมด 19 ml

4. Zinnat (125 mg/5 ml) ใช้ถ้วยตวงน้ำถึงขีด 20 ml ตามที่กำหนด เติมน้ำลงไปในขวดยา

5. Zithromax (200 mg/5 ml) ใช้ถ้วยตวงน้ำถึงขีด 9 ml ตามที่กำหนด เติมน้ำลงไปในขวดยา

ถ้าจ่ายขวดที่ยังไม่ได้ผสมน้ำ ให้ติดสติ๊กเกอร์วิธีผสมยาด้วย

****Meiact ชนิดซอง ให้ละลายในน้ำ 5-10 ซีซี จะได้น้ำสีส้ม รสหวาน ต้องทานให้หมดในครั้งเดียว ไม่ให้เก็บยาที่แบ่งใช้แล้ว****

*****Zmax ผสมน้ำ 60 ml หรือน้อยกว่านั้น โดยต้องดื่มให้หมดในครั้งเดียว*****